Zone Est

Oléo-Mail
Infos pratiques

CETIOM

WWW.CETIOM.FR

Vos contacts :
Louis-Marie Allard à Dijon : allard@cetiom.fr -Tél.03.80.72.22.50
Laurent Ruck à Châlons en Champ. : ruck@cetiom.fr -Tél.03.26.68.42.72

Le 05 octobre 2006

Défanage des tournesols avec retard de maturité

Cher(e) collègue,

Actuellement de trop nombreuses parcelles de tournesol ne sont pas encore récoltées et on note un retard de maturation pour certaines. Les conditions climatiques pluvieuses du mois d'août ont généré un développement tardif de feuilles vertes et ont engendré des attaques de botrytis et de sclérotinia sur capitules. Dans ces conditions un défanage chimique peut être envisagé.

Défolier consiste à détruire la masse verte des feuilles de tournesol avec un produit défanant. L'objectif de cette opération est de permettre de récolter 8 jours environ après le traitement, en profitant de quelques heures de temps sec pour que la moissonneuse-batteuse puisse entrer dans le champ.

Défanage chimique - mode d'emploi

Produit : réglone (diquat) à la dose de 2,5 à 3 l/ha

Stade d'application : lorsque la teneur en eau de la graine est inférieure à 30%.
On peut estimer qu'on est parvenu à ce taux de 30% lorsque :
- le dos du capitule est jaune
- les bractées du pourtour commencent à brunir
- la moitié des feuilles sont desséchées

Précaution d'usage : appliquer le produit en absence de vent

Récolte : respecter le délai avant récolte de 5 à 7 jours

L'équipe du CETIOM de la zone Est